

Informationen zu Impfungen

Impfungen zählen zu den größten Errungenschaften der modernen Medizin und stellen eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor teils schweren und lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten dar. Sie sind ein zentraler Bestandteil unserer kinderärztlichen Tätigkeit und tragen wesentlich zur Gesundheit Ihres Kindes bei.

Schutz für Ihr Kind und die Gemeinschaft

Impfungen schützen nicht nur Ihr eigenes Kind, sondern auch Menschen in seinem Umfeld, die aus medizinischen Gründen (noch) nicht selbst geimpft werden können. Dieser Gemeinschafts- oder Herdenschutz ist besonders für Säuglinge, chronisch kranke Kinder und immungeschwächte Personen von großer Bedeutung. Auch für Eltern ist es sinnvoll, den eigenen Impfstatus regelmäßig überprüfen zu lassen.

Wer empfiehlt Impfungen in Deutschland?

In Deutschland werden Impfeempfehlungen von der Ständigen Impfkommission (STIKO), einem unabhängigen Expertengremium, erarbeitet. Sie basieren auf umfangreichen wissenschaftlichen Daten zu Wirksamkeit, Sicherheit und Nutzen der Impfungen und werden regelmäßig aktualisiert. Diese Empfehlungen sind fester Bestandteil unserer medizinischen Überzeugung und unseres präventiven Behandlungskonzepts. Als Praxis stehen wir ausdrücklich hinter den STIKO-Empfehlungen und halten die empfohlenen Impfungen für medizinisch sinnvoll, sicher und notwendig zum Schutz Ihres Kindes.

Verträglichkeit und mögliche Impfreaktionen

Moderne Impfstoffe sind insgesamt sehr gut verträglich. Häufige Impfreaktionen sind meist mild und vorübergehend, z. B. Fieber, leichte Schmerzen oder Rötungen an der Einstichstelle sowie gelegentlich Müdigkeit oder Unwohlsein. Bei Bedarf kann nach der Impfung Paracetamol in altersgerechter Dosierung verabreicht werden; bei der Meningokokken-B-Impfung wird in den ersten 24 Stunden sogar eine vorbeugende Gabe empfohlen. Sollten unerwartete oder länger anhaltende Beschwerden (über drei Tage hinaus) auftreten, sprechen Sie uns bitte an.

Kombinationsimpfstoffe – bewährt und sinnvoll

Viele empfohlene Impfungen werden als Kombinationsimpfstoffe verabreicht, z. B. die Sechsfach-Impfung im Säuglingsalter oder die MMR-/MMRV-Impfung. Sie ermöglichen einen frühzeitigen und umfassenden Schutz mit deutlich weniger Injektionen. Eine Überforderung des kindlichen Immunsystems ist nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Kostenübernahme

Alle von der STIKO empfohlenen Impfungen werden von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen. Dies gilt auch für neuere Impfungen wie die Meningokokken-B-Impfung sowie die RSV-Impfung. Die Impfstoffe sind in unserer Praxis in der Regel vorrätig.

Beratung und Information

Über anstehende Impfungen informieren wir Sie rechtzeitig im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und besprechen das weitere Vorgehen individuell mit Ihnen. Weiterführende Informationen finden Sie unter:

- www.rki.de
- www.impfen-info.de

Bei allen Fragen rund um das Impfen sprechen Sie uns gerne jederzeit an.

Ihr Praxisteam Kind & Herz



Information zu Impfungen

Unser Impfplan in der Praxis Kind & Herz

		Alter in Monaten							Alter in Jahren				
Alter		2	3	4	5-6	11	12	13-14	16-23	2-4	5	6	13-15
Vorsorge			U4		U5	U6			U7	U7a/U8	U9		J1
Impfung	Rotaviren ^a	G1 ^a	G2										
	Tetanus ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d					A1	A2
	Diphtherie ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d					A1	A2
	Pertussis ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d					A1	A2
	Poliomyelitis ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d						A2
	Hib ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d						
	Hepatitis B ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d						
	Pneumokokken ^b	G1		G2 ^c			G3 ^d			Chron. Erkrankungen: PCV13 und PPSV23			
	Meningigits B	G1		G2 ^c				G3 ^d					
	Masern					G1		G2					
	Mumps					G1		G2					
	Röteln					G1		G2					
	Varizellen					G1		G2					
HPV												G1	G2
Meningitis ACWY													G1

	Geplanter Zeitpunkt
	Zeitraum für mögliche Impfungen
	Impfung noch nicht möglich / nicht mehr indiziert bzw. kontraindiziert ^a



Kombinations-Impfstoffe

G = Grundimmunisierung

A = Auffrischimpfung

^aErste Impfung ab 6 Wochen - spätestens bis 16. Woche, 2. Impfung vor 24. Woche

^bFrühgeborene (<37+0 SSW) 3+1 Schema mit zusätzlicher Impfung im Alter von 3 Monaten

^cMindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 2 Monate

^dMindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate

^eMindestabstand zwischen Pneumokokken 13 und 23: 6-12 Monate

^fImpfabstand G1 u. G2 min. 5 Monate;

bei Impfung ab 15 Jahren 3 Impfungen (0,1-2, 6 Monate)

Einverständnis-Erklärung für Impfungen

Auf der kommenden Seite finden sie eine Einverständnis-Erklärung für die notwendigen Impfungen.

Sie können das Formular gerne zu Hause ausdrucken und zum Impftermin mitzubringen. Es ist ansonsten auch im entsprechenden Formularpaket enthalten.

Natürlich besprechen wir dann nochmals vor Ort die vorgesehenen Impfungen und gehen gerne auf alle Fragen ein.

Weiterführenden Informationen und Links

- Impfen-Info: www.impfen-info.de
- RKI-Impfinformationen: www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen
- Kinderärzte im Netz - Impfinformationen: www.kinderaerzte-im-netz.de/impfen

Bei allen weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne jederzeit an.

Ihr Praxisteam Kind & Herz